



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 3 al 9 de febrer de 2014

La setmana continua sent generosa en nevades; en aquest cas amb vents de ponent i sud-oest. Són situacions propícies per nevades al vessants sud del Pirineu Occidental. Així, a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s'acumulen uns 50-60 cm a 2400 m, mentre que a la resta no passen d'uns 10 cm. Les temperatures es mantenen baixes o pròpies per l'època, negatives nit i dia per sobre de 2400 metres durant tota la setmana.

Damunt de les crostes de finals de gener segueix acumulant-se neu recent, sotmesa al principi a processos de gradient tèrmic mig i alt, però la seqüència de dies ennuvolats fa que el mantell deixi de refredar-se. No obstant, ha donat temps que es formin algunes facetes i també gebre en superfície de forma bastant generalitzada. A més, durant les nevades també cau força neu granulada. El dia 5 és el primer dia en què les temperatures comencen a recuperar-se; es registren algunes allaus de placa al pas de persones (Franja Nord de la Pallaresa, Ter-Freser) i allaus de lliscament a cotes baixes a l'Aran. El 8 de febrer baixa una altra allau de placa accidental al Pic de Padrons, al Prepirineu.



Allau accidental a prop del coll de l'Ós (Franja Nord de la Pallaresa) el 5 de febrer. L'allau de la dreta baixa de forma espontània, i poc després un esquiador provoca una altra allau de placa a l'esquerra; la víctima és rebolcada sense més conseqüències (Autor: Julià Montoliu).




Pirineu de Catalunya




PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic efectuat a la cicatriu de l'allau anterior, fet el dia següent a l'accident. Es veu un nivell de facetes no massa desenvolupades, però que poden ser suficients per col·lapsar les plaques de vent formades al seu damunt.



Neu granulada de mida gran observada el dia 7 a Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa). Un cop enterrada és un nivell que dóna inestabilitat al mantell.