



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 28 d'abril al 5 de maig de 2014

Durant aquesta setmana continua el temps inestable amb nevades i temperatures fresques, de manera que els gruixos de neu al terra no varien massa, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, degut a vàries entrades de nord. Destaca una nova nevada fins a 1600 m a principis de maig. Durant la primera quinzena de maig el temps és temperat amb xàfecs tempestuosos d'aigua fins a cotes altes, però a la segona meitat el temps és força fred i tornen les nevades, de vegades per sota dels 2000 m.

A finals d'abril i principi de maig, febles nevades en forma de xàfecs i temperatures sota zero mantenen un mantell amb característiques hivernals per sobre de 2400 m, amb algunes plaques de vent que ràpidament s'estabilitzen per efecte de la insolació. Per sota d'aquesta cota el regel nocturn és força efectiu i el mantell és estable. El mantell és encara continu per sobre de 2200-2300 m i els gruixos a 2300 metres es troben al voltant dels 200-240 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 60-200 cm a la resta del Pirineu occidental. Al Pirineu oriental els gruixos són molt inferiors i volten els 40-70 cm a 2300 m.

Durant la primera quinzena de maig no hi ha gaire activitat d'allaus, tan sols algunes plaques de fons en obagues i sota colls i carenes (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, Ter-Freser) degut als xàfecs d'aigua fins a cotes altes. L'activitat augmenta durant la segona quinzena de maig ja que va nevant i plovent i s'enregistren petites allaus de neu humida i alguna placa de fons de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ja que els gruixos de neu encara són notables.

Després d'un mes de maig fred en general, l'últim butlletí de perill d'allaus de la temporada 2013-14 s'emet el divendres 30 de maig.



Imatge del 29 d'abril de la Ribagorçana-Vall Fosca on es pot veure com per damunt de 2200 metres ha continuat l'acumulació de neu recent, mentre que per sota queda en superfície la neu vella bruta de fang.



Al Ter-Freser (Pirineu oriental) el mantell té certa continuïtat per sobre de 2300 metres, i així es manté fins a mitjan maig (imatge del 30 d'abril).



A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és on el mantell ha mantingut majors gruixos i continuïtat sobre el terra fins ben entrat el mes de maig. Imatge del 9 de maig, als voltants de Beret. A data 1 de juny el gruix de neu a l'estació de Bonaigua (2250 m) és de 157 cm, valor per sobre de la mitjana climàtica.



Cicatriu d'una allau de fons a l'Aran-Franja Nord d'ela Pallaresa, caiguda la primera setmana de maig (foto del dia 9 de maig).



Detall de la zona d'arribada de l'allau comentat anteriorment, de dipòsit considerable amb blocs de mida mètrica. A començament de juny, el dipòsit encara cobreix el fons del torrent.

