

Resumen nivològic semanal

Síntesis de la semana del 17 al 23 de noviembre de 2014

Evolución general. La semana comenzó con una ligera nevada de noroeste el lunes 17, con nieve reciente seca, pero con cantidades inferiores a 6 cm en general; la cota de nieve bajó hasta los 1300-1400 m aproximadamente. Esta nevada sólo afectó a las zonas habituales cuando hay entrada de vientos de noroeste: Aran-Franja Norte de la Pallaresa y algún copo en el resto de sectores más septentrionales. Desde el martes se ha mantenido una situación atmosférica dominada por un flujo del sur y sureste que ha hecho aumentar las temperaturas hasta valores muy por encima de los habituales y sin precipitaciones hasta el domingo 23.

Situación del manto nivoso. Esta nevada seca del lunes 17 ha acabado marchando de las laderas soleadas y sólo queda un nivel emblanquecido en las umbrías del Aran-Franja Norte de la Pallaresa por encima de 2000 m, que aún no es esquiable; hablamos de espesores a 2200 m inferiores a los 10 cm. La situación es muy diferente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en puntos de la Pallaresa, donde ya hay manto base debido a las nevadas de suroeste de principios de noviembre; está endurecido y está presente por encima aproximadamente de 1800-2000 m, pero con espesores que no pasan de unos 30 cm en cotas altas. En el Pirineo oriental el manto no es esquiable; es de distribución dispersa y de espesores inferiores a 10 cm en el Perafita-Puigpedrós y canales del Cadí-Moixeró; en el Ter-Freser y en el Prepirineo todavía falta la nieve.



Imagen del viernes 21 de noviembre de la vall de Ruda, Aran, en dirección sur.



Aspecto de la vall de Filià, en direcció oeste, el miércoles 19 de noviembre.

Perspectivas. Para principios de esta semana (24 a 30 de noviembre) se prevén algunas lluvias dispersas, con cota de nieve a 2600 m hoy lunes, que pueden ir bajando de cota a lo largo de la semana, como mucho hasta 2000 m. El flujo general continuará de procedencia mediterránea, entre este y sureste. Las temperaturas, aunque en descenso, continuarán por encima de las habituales para la época. Los espesores de nieve continuarán en la línea deficitaria actual. El manto puede retroceder ligeramente de cota, pero la contrapartida es que se irá endureciendo y podrá formar una buena base para futuras nevadas.