



Resumen nivològic semanal


Síntesis de la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016

Evolución general. Enfriamiento del manto con alguna nevada en el Pirineo oriental. Nieve polvo reciclada hasta el domingo en que se humedece en el sector oriental y, además, caen unos pocos cm de nieve reciente por encima de 1800-2000 m en el Ter-Freser.

Situación del manto nivoso. Tras las abundantes nevadas de mediados de noviembre, el manto se ha mantenido con espesores superiores a la media, a excepción del Aran donde han sido los normales o incluso por debajo de la media en su mitad norte. El mes se cierra con los siguientes valores de espesor de nieve a unos 2400 m: en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 70-120 cm, en el Pirineo Oriental entre 50-70 cm y en el Aran entre 30-50 cm.

La nieve en superficie es polvo reciclada. Se mantienen unos 10-30 cm seca y suelta, muy agradable de esquiar. A finales de semana, las orientaciones sur ya se han encostrado ligeramente. Destaca la formación de escarcha en superficie en todas las orientaciones y cotas, más pequeña en cotas altas. Las únicas condiciones de peligro se han localizado en cotas altas de orientaciones norte, oeste y este, donde el manto está más endurecido por la presencia de nieve venteada; aunque se iniciaban fracturas, éstas en general no tenían capacidad de propagación.

Perspectivas. Durante la semana actual, pasado el lunes ya no se prevé que nieve. El tiempo será anticiclónico a partir del martes-miércoles con enfriamiento de la nieve durante la noche por irradiación. La formación de costras superficiales irá incrementando día a día en las solanas. Habrá que controlar cómo ha quedado el manto por encima de 2200 m en el Ter-Freser donde continúa nevando el lunes día 5 con flujo de levante, pero cesando ya el martes, ya que bajo el manto está facetado y con escarcha enterrada.



Fíjese en las diferencias de distribución de la nieve por efecto de la insolación. Al fondo del torrente la nieve se mantiene polvo, mientras que en cota más alta donde llega la luz del sol, ya no hay nieve (Pico de Salòria al fondo, Pallaresa, miércoles 30 de noviembre de 2016. Foto: Cos Agents Rurals).



Nieve facetada con escarcha en superficie. Una vez nieve sobre ella, los colapsos serán probables (Coll de la Barra, Perafita-Puigpedrós, viernes 2 de diciembre. Foto: Gebreineu).

