



Resumen nivológico semanal

Síntesis de la semana del 26 de diciembre de 2016 al 1 de enero de 2017

Evolución general. Semana con una situación anticiclónica con temperaturas superiores a las normales en alta montaña y con pocos cambios en cuanto a la estabilidad del manto.

Situación del manto nivoso. La semana se ha caracterizado por un manto nivoso con pocas variaciones, en el sentido de mantenerse estable. En las umbrías predomina el manto en forma de nieve polvo reciclada y en las solanas con el aumento térmico diurno y el enfriamiento nocturno predominan las costras superficiales, pero finas y quebradizas. Sólo se prevé que por encima del 2400-2500 m pueda haber alguna placa de viento por encima de las capas débiles persistentes.

En todos los sectores el problema por aludes se ha centrado en la existencia de capas débiles persistentes, excepto en el Aran donde se ha dado una situación favorable al haber poca nieve y ser muy estable. El peligro ha sido DÉBIL (1) en todos los sectores, exceptuando por encima de los 2400 a 2500 m en el Pirineo Oriental y en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, por la posibilidad de alguna placa de viento aislada por encima de capas débiles.

Perspectivas. No se ven demasiados cambios para la primera semana de enero. Se mantiene el anticiclón y la falta de precipitaciones. Sólo se observa un descenso de la temperatura debido a la proximidad de una masa fría situada en el noreste de Europa.



En el Pirineo Oriental, por encima de los 2400 m, el manto se encuentra venteado y transformado en las solanas (zona Perafita- Puigpedrós- La Carbassa).



En el Pirineo Occidental la falta de precipitaciones hace aflorar en superficie la costra de rehielo marrón de inicio de la temporada, sobre todo en las cotas más altas donde el viento ha barrido la nieve polvo reciclada.