



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 8 al 14 de maig de 2017

Evolució general. La situació primaveral amb predomini de la fusió a tots els sectors i cotes s'ha vist interrompuda entre dimecres i dijous per un episodi de precipitacions. S'han registrat algunes allaus superficials de fusió.

Situació del mantell nival. En iniciar-se la setmana hi ha hagut neu a partir de 2000-2100 m a les orientacions obagues i de 2400 m a les solanes, on el mantell s'ha presentat discontinu a totes les cotes. El mantell estava format gairebé íntegrament per gra de fusió i crostes, per bé que a les obagues encara s'ha pogut trobar nivells de facetes o gobelets arrodonits a la base. El grau de perill ha sigut FEBLE (1) a tots els sectors, ja que només es preveien allaus, com a molt de mida 2, a les orientacions obagues.

Entre dimecres i dijous ha tingut lloc un episodi de precipitacions; la cota de neu ha baixat dels 2600-2700 als 2100-2200 m. A 2500 m es s'han acumulat 25-30 cm de neu nova a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, incloent la seva Franja Nord, tot i que probablement a cotes superiors les acumulacions hagin estat superiors; el Perafita-Puigpedrós i el Ter-Freser han estat els sectors menys innivats en aquest episodi. El perill ha augmentat a MODERAT (2) al Pirineu Occidental, donada la probabilitat d'allaus de fusió entre divendres i diumenge. S'han registrat allaus de mida 1 a la Franja Nord Pallaresa que no han afectat la neu antiga; han tingut lloc a orientacions obagues, on la neu nova ha trobat un mantell preexistent amb certa continuïtat.

Entre divendres i diumenge les temperatures han anat augmentant progressivament, amb valors màxims propers als 10° C a 2300 m diumenge. S'ha registrat algun ruixat de tarda poc quantiós. Amb tot, el procés de fusió s'ha continuat consolidant a tots els sectors, amb el conseqüent estovament del mantell i la progressiva desaparició de les crostes de regel.

Perspectives per la setmana del 15 al 21 de maig. La setmana s'iniciarà amb temps anticiclònic i pujada progressiva de temperatures; el regel serà escàs o inexistent, i la neu continuarà presentant-se molt humida i perdent duresa. A partir de dijous, l'arribada d'un solc farà baixar les temperatures i donarà lloc a precipitacions, en forma de neu per sobre de 2000-2200 m.



Imatge del Gra de Fajol Petit (Ter-Freser) de dimecres 10 de maig. La manca de precipitacions destacables bona part de la primavera ha fet que, fins i tot a les orientacions obagues, la disponibilitat de neu en aquest sector sigui molt baixa.



Imatge de Filià (Ribagorçana-Vall Fosca) de dijous 11 de maig. La cota de neu va baixar per sota de 2200 m durant la nevada. A bona part de les orientacions la neu va caure directament sobre el terra.



Imatge de Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa) del dia 12 de maig. S'aprecien diverses caigudes naturals de purgues o petites allaus de fusió en orientacions obagues entre 2200 i 2600 m.