



## Resumen nivològic semanal

### Síntesis de la semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2018


**Evolución general.** El mes de mayo ha llegado con su versión más activa y dinámica desde el punto de vista de la precipitación, pero con temperaturas más propias del invierno. Las nevadas registradas han depositado sobre un manto fuertemente endurecido por rehielo y no ha habido avalanchas de tamaño considerable.

**Situación del manto nivoso.** El lunes ha continuado el episodio de nevadas y frío con el que concluyó la semana anterior. En conjunto se han recogido 10-20 cm a todos los sectores, con viento débil de norte y cota de nieve que ha subido hasta 1800 m. El citado descenso térmico ha hecho que la nieve antigua, previamente muy húmeda, haya sufrido un fuerte rehielo. Las condiciones para la práctica del esquí han sido muy buenas, con reciente bien distribuida sobre un manto antiguo fuertemente estabilizado.

Entre el martes y el sábado las nevadas con cota de nieve inferior a 1800 m se han sucedido en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Ha predominado el viento suave de componente norte y oeste y se han formado pequeñas acumulaciones a sotavento; en el resto de sectores las nevadas han tenido forma de chubasco de tarde y las acumulaciones han sido escasas e irregulares. Con todo, los principales problemas por aludes han sido de nieve reciente y de nieve venteada; se ha registrado algunas purgas de nieve reciente a todos los sectores del Pirineo Occidental, en general de tamaño insuficiente para enterrar una persona. A partir del miércoles, en toda la vertiente sur, en los ratos de sol el manto se transformaba rápidamente en superficie, y la nieve se presentaba ligeramente húmeda.

El fin de semana se ha caracterizado por la recuperación de las temperaturas a valores más propios del mes de mayo, y por el progresivo humedecimiento de la nieve acumulada esta semana en el Aran.

**Perspectivas.** El ascenso de temperaturas, los chubascos de tarde con cota de nieve superior a 2700 m y los ratos de sol matinales harán que el manto vuelva a manifestar problemas de nieve húmeda. La nieve irá retrocediendo en todas las orientaciones y el manto se presentará muy discontinuo en las soleadas.



Evolució del espesor de nieve en Certascan (2.400 m, Franja Nord de la Pallaresa). Entre el lunes y el sábado se han registrado nevadas en este sector, pudiendo destacar las del jueves. En el periodo se han acumulado más de 120 mm en este observatorio.



Imagen de Boí (Ribagorçana-Vall Fosca) del miércoles 2 de mayo de 2018. Los últimos episodios de nevada han tapado la nieve marrón de las semanas anteriores. La cobertura nival ha sido buena para el momento de la temporada en que nos encontramos. Se pueden observar aludes de nieve reciente que involucran poco espesor.

