



Resum nivològic semanal

Síntesis de la semana del 24 al 30 de abril de 2023

Evolución general

Semana determinada por pocos cambios en el manto, con algún chubasco aislado, sin consecuencias en cuanto al peligro por aludes.

Situación del manto nivoso

La semana ha continuado marcada por una regresión del manto nivoso en todo el Pirineo, en especial en el occidental, que es donde el manto todavía tenía algo más de extensión.

El encostramiento superficial ha sido débil y se ha observado nieve húmeda en superficie desde buena mañana. Internamente, todavía aparecen costras más duras y resistentes, intercaladas con el grano húmedo. La nieve en el suelo ha seguido reculando, sobre todo debido a la radiación, las temperaturas positivas y los chubascos de días atrás. El manto es difícilmente esquiable en cualquier sector y sólo hay cierta continuidad a partir de unos 2.200 o 2.300 en las umbrías.

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay cierta continuidad de manto sólo por encima de los 2.300 m en orientaciones umbrías. En orientaciones solanas el manto es irregular o muy escaso.

Los espesores a umbrías oscilan entre los 10-40 cm a 2.200 m y están muy por debajo de los habituales por estas fechas. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca encontramos presencia de nieve en orientación norte también a partir de los 2.200 m, aunque con discontinuidades, siendo más continua a partir de los 2.300 m. Los espesores se mueven entre los 10 y los 30 cm en las umbrías, a 2.200 m y en las solanas la nieve es muy escasa o inexistente. En el resto de sectores la cantidad de nieve es muy baja. El manto nivoso se concentra en neveros, torrentes y tubos, básicamente umbrías. En todo el Pirineo los grosores están muy por debajo de los habituales por estas fechas.

Ya no hay grado de peligro ni problemas de aludes evidentes en ningún sector debido al poco grosor y la escasez del manto.



Vessant Nord del Cadí, el dia 24 de abril, con algunos neveros dentro de las Canals.



Manto escaso en Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa), el 26 de abril. Aparece una nieve encostrada y sometida al continuo proceso de fusión-rehielo.



El manto es escaso o inexistente en solanas en el Port d'Erta (Ribagorçana-Vall Fosca), el día 26. Sólo se observa continuidad en umbrías, por encima de los 2.400 m.