

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 29 de gener al 4 de febrer de 2024


La setmana ha estat estable, amb domini de l'anticicló i un mantell assentat i sense problemes per allaus. La dinàmica ha estat la típica primaveral, amb fusió-regel, sobretot en solanes. L'encrostament del mantell és general, inclús a obagues, tot i que en aquestes orientacions nord s'observen capes superficials amb neu facetada procedent de la neu pols vella que s'ha anat transformant en pols reciclada. En els sectors on ha treballat el vent apareixen crostes relliscoses, vidrioses, que s'han vist mot degradades amb el pas dels dies.

Els perfils i tests efectuats en el terreny mostren alguns trencaments d'aquesta neu facetada però sense propagar. En alguns casos, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, s'observa alguna cisalla en la capa de neu pols reciclada, però no va a més, a causa del bon lligam d'aquesta neu facetada damunt de les crostes de pluja antigues.

En general, a tot el Pirineu el mantell es presenta endurit i estable a causa del regel i les crostes superficials. La dinàmica de tota la setmana ha estat molt primaveral, amb condicions favorables, sobretot a primera hora. El mantell més superficial s'ha estovat a causa de la radiació i l'ambient suau, amb alguns problemes puntuals per neu humida, que només han generat alguna purga durant el cap de setmana a l'Aran, a orientació E-NE, en terreny inclinat.

Al llarg de la setmana la situació ha estat favorable, sense problemes per allaus, i només durant el cap de setmana va aparèixer el problema de neu humida a causa de possibles purgues en terreny inclinat, en solanes de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i també lliscaments basals aïllats per l'humitejament de la base del mantell. El grau de perill va ser Feble (1) en tots els sectors.

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa trobem presència de neu a partir de 1.600 a obagues i a partir dels 1.800 m en solanes, de manera discontinua. El mantell era esquiable a partir d'uns 1.800 m a obagues i de 2.100 m a solanes, amb gruixos d'entre 35 i 50 cm a 2.200 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi havia neu a terra per damunt d'uns 1.900 m al nord del sector, amb continuïtat per damunt de 2.000 o 2.100 m, tot i que no era esquiable a cap cota, excepte a alguna cubeta o canaleta. A solanes, la neu vella apareixia de manera discontinua per damunt de 2.200 m. Al Perafita-Puigpedrós el mantell, en general, no era esquiable i la neu presentava certa continuïtat per damunt de 2.300-2.400 m. Els gruixos a 2.200 m eren inferiors a 15 cm. A la resta de sectors trobàvem una mica més de neu al Prepirineu, amb gruixos d'entre 10 i 20 cm a cota alta i també al Vessant Nord el Cadí Moixeró (a la base de les Canals). Al Ter-Freser el mantell només presentava certa continuïtat a obagues per damunt d'uns 2.500 m. A tot el Pirineu els gruixos estan molt per sota del que tocava en aquestes dates.



Evolució de la temperatura ambiental a l'estació de Certascan (Franja Nord de la Pallaresa), a 2.400 m. Els dies anticiclònics fan pujar la temperatura fins els 10 °C i durant gran part de les nits no s'assoleixen valors negatius, excepte en la matinada dels dies 1 i 2. El mantell es manté endurit i no es desfà a les obagues a causa de la baixa humitat ambiental registrada.



El mantell és molt escàs al sector del Perafita i apareix endurit a solanes, el dia 31. Els gruixos són escassos i apareixen grans irregularitats, amb alguns vessants més innivats per damunt dels 2.400 m.



Mantell uniforme però escàs a la Bonaigua (Franja Nord de la Pallaresa), el dia 1 de febrer.

