



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 15 al 21 d'abril de 2024

Setmana estable i tranquil·la, amb un mantell assentat i sense activitat allavosa, tret d'alguna purga natural a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A inici de setmana el mantell ha destacat per la presència de crostes marrons a les obagues de cotes altes i una manca de neu o un mantell discontinu fins als cims a les solanes. El regel nocturn ha estat molt limitat, present, sobretot, a les obagues.

Aquesta ha estat la tercera setmana de retrocés i humitejament del mantell. De fet, va començar amb un mantell molt humit a bona part del seu gruix, amb densitats superiors a 400 kg/m^3 a bona part del mantell. A alguns sectors encara hi ha alguna faceta o gobelet arrodonit a la base, però van desapareixent amb el pas dels dies.

Entre dimecres i divendres la fusió ha estat menor a causa d'un descens de les temperatures, amb una glopada de d'aire fred, amb vent del nord-oest, que va deixar uns 5 cm de neu recent a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El regel ha estat molt destacable a la part superior del mantell i s'han format crostes de 15-20 cm a la majoria de sectors. Aquest encrostament ens ha fet passar a una situació favorable a la Ribagorçana-Vall Fosca, Pallaresa i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró.


Dijous, l'episodi de neu i vent, va obligar a deixar una situació de plaques de vent a les obagues més elevades de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a uns 2.200 m, es troben entre els 20 i els 60 cm a obagues, sent menors a la meitat nord de l'Aran. El mantell és esquiable en orientació nord a partir d'uns 2.000-2.100 m, mentre que a la resta d'orientacions el mantell és discontinu fins als cims.

A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca hi ha neu a obagues per sobre de 2.100-2.200 m. En vessant sud, el mantell és discontinu fins als cims. Els gruixos totals a obagues a uns 2.300 m volten els 20-50 cm.

Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos a tot el sector són inferiors als habituals per aquestes dates, amb uns 10-30 cm a obagues 2.200 m. Al Moixeró només queden congestes o un mantell molt discontinu a partir dels 2.200 m. Fora del terreny obac, la presència de neu és molt escassa i irregular.


A la resta de sectors, la presència de neu és escassa al sector, a causa d'un abril sense nevades i amb fusió. Podem trobar neu a partir de 2.100-2.200 m a orientacions nord i nord-est, difícilment esquiable. A la resta de terreny el mantell nival està format per congestes aïllades de distribució irregular.



Evolució del gruix de neu a terra a l'estació de Certascan (Franja Nord de la Pallaresa), a 2.400 m, entre el 15 i el 21 d'abril. El mantell presenta un increment de 5 cm entre els dies 18 i 19 a causa d'una nevada feble.



Mantell present només a obagues, a Filià (Vall Fosca), el dia 18 d'abril. A les solanes hi ha molta discontinuïtat o algunes congestes.



Mantell en retrocés, amb més continuïtat a les obagues de la Bonàigua, el dia 20 d'abril. En superfície encara afloren les crostes marrons. El gruix total a terra, a 2.300 m, a obagues, oscil·la entre els 30 i els 60 cm.

