



Resumen nivològic semanal

Síntesis de la semana del 15 al 21 de abril de 2024

Semana estable y tranquila, con un manto asentado y sin actividad avalanchosa, salvo alguna purga natural en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A inicio de semana el manto ha destacado por la presencia de costras marrones en las umbrías de cotas altas y una falta de nieve o un manto discontinuo hasta las cimas, en las solanas. El rehielo nocturno ha sido muy limitado, presente, sobre todo, en las umbrías.

Ésta ha sido la tercera semana de retroceso y humedecimiento del manto. De hecho, empezó con un manto muy húmedo en buena parte de su grosor, con densidades superiores a 400 kg/m^3 en buena parte del manto. En algunos sectores todavía hay alguna faceta o cubilete redondeado en la base, pero van desapareciendo con el paso de los días.

Entre el miércoles y el viernes la fusión ha sido menor a causa de un descenso de las temperaturas, con una entrada de aire frío, con viento del noroeste, que dejó unos 5 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El rehielo ha sido muy destacable en la parte superior del manto y se han formado costras de 15-20 cm en la mayoría de sectores. Este encostramiento nos ha hecho pasar a una situación favorable en la Ribagorçana-Vall Fosca, Pallaresa y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró.

El jueves, el episodio de nieve y viento, obligó a dejar una situación de placas de viento en las umbrías más elevadas del Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a uns 2.200 m, es troben entre els 20 i els 60 cm a obagues, sent menors a la meitat nord de l'Aran. El mantell és esquiable en orientació nord a partir d'uns 2.000-2.100 m, mentre que a la resta d'orientacions el mantell és discontinu fins als cims.

A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca hi ha neu a obagues per sobre de 2.100-2.200 m. En vessant sud, el mantell és discontinu fins als cims. Els gruixos totals a obagues a uns 2.300 m volten els 20-50 cm.

Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos a tot el sector són inferiors als habituals per aquestes dates, amb uns 10-30 cm a obagues 2.200 m. Al Moixeró només queden congestes o un mantell molt discontinu a partir dels 2.200 m. Fora del terreny obac, la presència de neu és molt escassa i irregular.


A la resta de sectors, la presència de neu és escassa al sector, a causa d'un abril sense nevades i amb fusió. Podem trobar neu a partir de 2.100-2.200 m a orientacions nord i nord-est, difícilment esquiable. Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, a unos 2.200 m, se encuentran entre los 20 y los 60 cm en umbrías, siendo menores en la mitad norte de Aran. El manto es esquiable en orientación norte a partir de unos 2.000-2.100 m, mientras que en el resto de orientaciones el manto es discontinuo hasta las cimas.

En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca hay nieve a umbrías por encima de 2.100-2.200 m. En ladera sur, el manto es discontinuo hasta las cimas. Los espesores totales en umbrías a unos 2.300 m rondan los 20-50 cm.



En el Vessant Nord del Cadí-Moixeró los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 10-30 cm en umbrías, a 2.200 m. En el Moixeró sólo quedan neveros o un manto muy discontinuo a partir de los 2.200 m. Fuera del terreno umbrío, la presencia de nieve es muy escasa e irregular.


En el resto de sectores, la presencia de nieve es escasa en el sector, debido a un abril sin nevadas y con fusión. Podemos encontrar nieve a partir de 2.100-2.200 m en orientaciones norte y noreste, difícilmente esquiable. En el resto de terreno el manto nivoso está formado por ventisqueros aislados de distribución irregular.



Evolución del grosor de nieve en tierra en la estación de Certascan (Franja Nord de la Pallaresa), a 2.400 m, entre el 15 y el 21 de abril. El manto presenta un incremento de 5 cm entre los días 18 y 19 a causa de una nevada débil.



Manto presente sólo en umbrías, en Filià (Vall Fosca), el día 18 de abril. En las solanas hay mucha discontinuidad o algunos ventisqueros.



Manto en retroceso, con mayor continuidad en las umbrías de la Bonaigua, el día 20 de abril. En superficie todavía afloran las costras marrones. El grosor total en el suelo, a 2.300 m, en umbrías, oscila entre los 30 y los 60 cm

