



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 6 al 12 de maig de 2024

L'activitat d'allaus aquesta setmana he estat escassa malgrat l'alt nivell d'humitejament del mantell i les altes temperatures, amb elevada insolació, probablement degut al darrer episodi de pluges de fa unes dues setmanes que va provocar una intensa activitat i va purgar gran part dels vessants.

Els perfils han mostrat un mantell humit tota la setmana, amb crostes internes que s'han anat afeblint i degradant per les condicions meteorològiques que han mantingut el mantell isoterm, alhora que també han anat minvant les crostes superficials. De fet, les condicions previstes del mantell a final de setmana ja no mostraven la formació de regel per l'augment de la humitat i nuvolositat, a més de les temperatures altes.


El grau de perill ha anat baixant al llarg de la setmana, des de Moderat (2) a inicis de setmana a tots els sectors excepte al Prepirineu, on va ser Feble (1), sempre vinculat a problemes de neu humida i, en menor mesura, a plaques de vent (només a principis de setmana), fins a grau Feble (1) divendres. Dissabte, per les previsions de pluges per a diumenge i dilluns a totes les cotes, el grau s'ha elevat a Moderat (2) al sector occidental, per sobre de 2.200 m, durant els episodis de pluja, per neu humida, i lliscaments a l'Aran i la Franja Nord de la Pallaresa, on hi ha més neu i s'espera més precipitació.

Pel que fa a la distribució del mantell nival, a la Franja Nord de la Pallaresa, la presència de neu a terra va minvant, tant en gruix com en extensió. Trobem neu en orientació sud a uns 2.200 m de forma testimonial, i a partir de 2.400 m hi és més present però de forma discontinua fins als cims. En nord, la trobem a uns 1.900 m i amb certa continuïtat a partir d'uns 2.200 m.

A la Pallaresa el mantell nival és discontinu en sud fins als cims, mentre que en orientació nord trobem neu a partir d'uns 2.000 m de forma discontinua i a partir d'uns 2.200 m amb una certa continuïtat. A la Ribagorçana-Vall Fosca els gruixos a 2.500 m volten els 70 cm, pròxims als valors normals per aquestes dates.

Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser hi ha presència de neu a terra per sobre d'uns 2.200 m en nord, amb mantell esquiable a partir d'uns 2.300 m a obagues. En orientació sud, en alguns sectors, hi ha presència de neu a partir d'uns 2.400 m però és escassa i discontinua sovint fins als cims.


Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró hi ha presència de neu a terra, amb certa continuïtat, per sobre d'uns 2.400 m en nord. Per sota dels 2.100 m la neu és testimonial o es presenta força discontinua. En orientació sud la neu només és present a les cotes més altes, en la línia dels cims.



Evolució del gruix de neu a terra a l'estació de Boí (Ribagorçana-Vall Fosca), a 2.535 m, entre el 6 i el 12 de maig. El mantell presenta un progressiu descens a causa de la fusió diària, sobretot a partir de mitja setmana.



Mantell escàs, amb neu a terra a partir dels 2.100 m al Vessant Nord del Cadí, el dia 6 de maig.



Allaus de neu humida a Boí (Ribagorçana-Vall Fosca), el dia 7 de maig.



Dipòsits antics d'allaus observades a Espot (Pallaresa), el dia 8 de maig.



Mantell continu, amb un aspecte hivernal, a Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa), el dia 9 de maig.



Recorregut i dipòsit d'una allau de neu humida al bosc d'Aixeus, a la Vallferrera (Pallaresa), el dia 10, amb boles de mida considerable. L'allau va caure de manera natural, probablement, durant l'episodi de neu i pluja de primers de maig.

