



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 13 al 19 de maig de 2024

Les nevades d'aquesta setmana s'han dipositat sobre el terra a bona part del terreny i només sobre neu vella a les obagues per damunt de 2.100 m a la Franja Nord de la Pallaresa, a la Ribagorçana-Vall Fosca o a la Pallaresa. De fet, aquesta setmana s'han anat succeint les precipitacions, en forma de xàfecs, amb uns 5 o 10 cm dimarts i uns 10-15 cm divendres, partint d'un mantell ja només present a obagues, bàsicament en el Pirineu Occidental, i per damunt de 2.100-2200 m. La cota de neu va anar fluctuant entre els 1800 m i els 2.300 m.


Els darrers perfils daten de dimarts, dia 14, a Vallter i Tavascan i mostren uns 20 cm de formes humides, molt denses, sota les quals hi ha crostes gruixudes i molt dures (duresa 4 i 5). A mitja setmana les nevades han sigut les protagonistes, amb cota fluctuant entre els 2.100 de dimarts i els 1.700 de dijous. Els increments dels gruixos de neu han estat discrets, de fins a 6 cm a la Pallaresa, sent molt propi d'aquesta època disminucions de l'ordre de 10 cm al dia.

En general, el mantell compleix les característiques típiques primaverals, amb una prima capa de neu recent a cota alta a causa dels xàfecs diaris i una neu més humida en el gruix del mantell, que s'alterna amb crostes dures internes. La neu vella ha estat present a partir de 2.100 m a obagues i a partir de 2.400-2.500 m amb discontinuïtats fins als cims, a la resta d'orientacions.


A la Ribagorçana i a les obagues del nord de la Pallaresa trobem neu a partir d'uns 2.100 m de forma discontinua i a partir d'uns 2.300 m amb certa continuïtat. El mantell antic és testimonial fora del terreny obac fins als cims. Els gruixos a 2500 m volten els 60 cm, i són els normals o lleugerament inferiors als habituals per l'època. Al Pirineu més oriental, fora del terreny més alt i de les obagues elevades, la presència de neu vella queda reduïda a congestes.

Les condicions del mantell nival són els propis de la primavera avançada, amb neu vella per damunt d'uns 2200-2300 m a terreny obac, ocasionalment cobert, a cota alta, per una prima capa de les enfarinades dels últims dies.

El grau de perill ha estat Feble (1) al Pirineu occidental, sempre vinculat a problemes de neu recent (humitejada per la fluctuació de la cota i de les clarianes). A partir de divendres es van emetre notes nivològiques i es va suprimir el grau de perill.



Evolució del gruix de neu a terra a l'estació de Boí (Ribagorçana-Vall Fosca), a 2.535 m, entre el 13 i el 19 de maig. El mantell presenta un ascens de gairebé 15 cm de neu nova pels xàfecs que van descarregar entre el 17 i el 18 de maig.



Els gruixos totals en aquest sector de la Ribagorçana estan per damunt del percentil 50, és a dir, que són els normals o lleugerament excedentaris per aquestes dates.



Restes d'un dipòsit antic d'una allau de fusió a la canal de l'Ordiguer (Vessant Nord del Cadí), el dia 13 de maig.



Mantell continu a partir dels 2.300 m a Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa), amb algunes allaus de neu humida, de mida 1 (petita), el dia 14 de maig.

