



## **Resumen nivològic semanal**

### **Síntesis de la semana del 20 al 26 de mayo de 2024**

El manto sigue formado por formas húmedas y costras duras. En superficie, los chubascos diarios han ido aportando una fina capa de nieve reciente, en muchos casos de nieve granulada, con una cota que se ha movido por encima de los 2200 - 2400 m.


En el último y único perfil realizado cerca del Tuc de Marterat (Franja Nord de la Pallaresa), este jueves día 23, a 2.600 m, se puede observar un poco de nieve granulada en superficie, sobre costras de dureza 4 (muy duras). Por debajo de estas costras sigue el manto primaveral, húmedo. Internamente, encontramos más costras duras y todavía aparece oculta alguna faceta redondeada antigua, medio deshecha.

En el Pirineo occidental la nieve vieja está presente a partir de 2.100-2.200 m en umbrías, de manera discontinua hasta los 2.400 m. En el resto de orientaciones, a partir de 2.400-2.500 m, aparece con discontinuidades hasta las cumbres.

En Perafita-Puigpedrós encontramos presencia de nieve vieja por encima de unos 2.400 m en las umbrías. Fuera del terreno más alto y umbrío, la presencia de nieve queda reducida a ventisqueros. Aunque el manto está internamente húmedo, se espera cierto rehielo superficial, sobre todo a primera hora del día.

En Ter-Freser encontramos nieve discontinua por encima de los 2.200-2.300 m en umbrías y en Cadí solo hay nieve en la parte superior de les Canals.

En la Ribagorçana-Vall Fosca, a 2.500 m los espesores superan el percentil 50, así como en algunos sectores de la Franja Nord de la Pallaresa (Certascan) y son los normales para estas fechas.



Evolució de la lluvia semi-horaria en la estació de Boí (Ribagorçana-Vall Fosca), a 2.535 m, entre el 20 i el 26 de maig. Els chubascos de caràcter convectiu se han ido repitiendo a lo largo de la semana, con una cota de nieve alta, por encima de los 2.300 m, aproximadamente



Manto presente, de manera discontinua a partir de los 2.100-2.200 m, fuera de las umbrías, en la Franja Nord de la Pallaresa, el día 23.



En las umbrías elevadas, por encima de los 2.600 m en el sector del Tuc de Marterat (Franja Nord de la Pallaresa), todavía hay un manto continuo y un espesor considerable, con acumulaciones que se acercan a los 100 cm.

