

## Resumen nivològic semanal

### Síntesis de la semana del 21 al 27 de abril de 2025.

A lo largo de la semana ha predominado un manto superficialmente encostrado en las primeras horas del día, y húmedo en sus capas más internas. El rehielo nocturno y de la madrugada desaparece rápidamente con el paso de las horas, con el predominio del típico proceso primaveral de fusión-rehielo.

El paso de un frente poco activo a principios de semana deja nieve a cotas superiores a los 2.200 m, con un ambiente muy suave. El miércoles, día 23, en el Pirineo oriental y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró cae una ligera nevada con cota a partir de los 2.100 m. La nieve reciente es húmeda a partir de los 2.100 m, en todas las orientaciones.


Durante el fin de semana pasa un frente y las precipitaciones en forma de chubascos dejan una nevada débil en el Arán-Franja Nord Pallaresa, en el Ter-Freser y en el Prepirineo (de 5 a 10 cm), con una cota que baja, puntualmente, hasta los 2.200 m. En la Franja Nord Pallaresa, por encima de los 1.850 m hasta los 2.400 m, encontramos nieve primavera reblandecida por la lluvia en todas las orientaciones. Se observan signos de estos chubascos con lluvia, con presencia de surcos y cuencas desde los 1.900 m hasta la cima.

Durante la actividad en terreno con esquís de montaña, se encuentra el manto encostrado –no portante– a primera hora, ya humedecido, y de forma puntual y testimonial, alguna costra aún resistente en las primeras horas. Estas costras, sin embargo, se humedecen rápidamente con el paso del tiempo. Se observa la caída de bolas de nieve en las laderas soleadas por encima de los 2.100 m, así como hundimiento del esquí hasta el tobillo. Hay presencia de nieve discontinua a partir de los 1.800 m, por ejemplo, en el Arán-Franja Nord Pallaresa, ganando continuidad a partir de los 2.000 m en las umbrías, y por encima de los 2.300 m en las solanas.

En el Arán-Franja Nord de la Pallaresa y en la Pallaresa encontramos nieve en el suelo por encima de los 1.900 m en orientaciones norte y de 2.100 m en sur. A unos 2.300 m los espesores rondan los 80-120 cm y se encuentran algo por debajo de los valores normales para la época. En la Ribagorçana-Vall Fosca, a unos 2.500 m, los espesores rondan los 150 cm y sobre los 110 cm en la Pallaresa. En el Ter-Freser, a 2.400 m, hay unos 60-80 cm de espesor total, superiores a los normales para la época del año. En el Vessant Nord del Cadí-Moixeró rozan los 80 cm a 2.300 m y los espesores son normales para la época.

En cuanto a la actividad, el lunes 21 se observa la caída de placas húmedas, naturales, de tamaño mediano en el Còth deth Horo y Malh dera Artiga (Arán) y en la Peulha (Franja Nord Pallaresa). Durante el fin de semana caen purgas naturales (pequeñas) en la Ribagorçana-Vall Fosca y también en el Moixeró.


Con la nevada del fin de semana, el grado de peligro sube a Limitado (2) - Notable (3), por encima de los 2.400 m, en el Arán-Franja Nord-Pallaresa y en el Ter-Freser, debido a problemas con la nieve húmeda y las placas de viento. En el resto de sectores se mantiene en Limitado (2).



Evolució del espesor de nieve en el suelo en la estación de Port del Comte (Prepirineo), a 2.290 m. Se observa un aumento del espesor, el sábado, de 10 cm de nieve nueva, debido a los chubascos con cota de nieve hasta los 2.200 m.




Aludes naturales de nieve reciente (húmeda), de tamaño pequeño, en la Pica Cervi (Ribagorçana), el 21 de abril.



Manto continuo, con nieve húmeda, camino del coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós), el 22 de abril.



Bolas y purgas naturales de nieve húmeda, de tamaño pequeño, el 23 de abril, en Boí-Taüll (Ribagorçana).



Manto viejo, con nieve húmeda y costras marrones aflorando en la superficie, el 25 de abril, en Espot-Brusseres.

