

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 5 a l'11 de maig de 2025.


Segueix la dinàmica primaveral, amb un mantell format per neu humida, des de la seva superfície fins a la base, amb l'alternança de crostes molt degradades i la presència de la capa marró de pols sahariana. A primera hora del dia trobem un mantell regelat, endurit i estable, però amb l'avanç de la jornada el mantell s'humiteja i s'estova per la insolació i l'augment de temperatures.

En circular pel territori (Vall Fosca, dimecres, dia 7) trobem neu primavera a partir dels 2.100 m a obagues, fins als 2.300 m. A partir d'aquesta cota, apareixen crostes portants (sobretot a obagues) i no portants, de manera menys general. També trobem neu recent humida per damunt els 2.350 m de forma discontinua, a causa dels darrers xàfecs, sobretot a obagues. Aquesta neu més nova s'humiteja amb l'avanç de la jornada i de la radiació intensa. A causa dels ruixats amb aigua a cota alta, apareixen solcs generalitzats arreu, així com caiguda de boles a totes orientacions, per damunt els 2.200 m. No s'observen indicis de la presència de plaques.

Pel que fa a activitat allavosa, hi ha caiguda de boles i purgues naturals, de mida 1 (petita), a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. De fet, se'ns reporta un incident pel trencament accidental d'una placa humida a un vessant de forta inclinació (a obaga), a les Picardes (Pallaresa), sense conseqüències per a l'esquiador que provoca l'allau.

Pel que fa a la distribució del mantell, hi ha neu al Pirineu occidental per sobre de 2.100 m en orientacions nord i de 2.200 m en orientacions sud. En moments de xàfec, aquesta cota baixa, localment, fins els 1.800 m. A uns 2.300 m els gruixos volten els 70-90 cm i es troben per sota dels valors normals per a l'època. A la Ribagorçana-Vall Fosca encara trobem gruixos al voltant dels 140 cm, a 2.500 m. Al Pirineu oriental i al Perafita-Puigpedrós el gruix a 2.400 m es mou entre els 40 i els 60 cm. Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu trobem prop de 40 cm a la cota 2.300 m, a obagues.

El grau de perill s'ha mantingut en Feble (1) al matí i Moderat (2) a migdia a tots els sectors, pels problemes amb la neu humida.



Evolució del gruix de neu a terra a l'estació de Boí (Ribagorçana), a 2.535 m. S'observa un ascens del gruix a causa dels xàfecs a partir de mitja setmana. El gruix total és de 137 cm.




Purgues de neu humida a Filià (Vall Fosca), el 7 de maig. Les crostes marrons apareixen en la superfície, barrejades amb la neu més recent (humitejada), que han anat deixant els darrers xàfecs.



Placa humida, de mida petita, desencadenada accidentalment per un esquiador (sense conseqüències), el dia 9 de maig, a les Picardes (Pallaresa). Imatge: LauEGI.



Mantell en retrocés amb una enfarinada per damunt dels 2.200 m, el 9 de maig, a Tavascan (Franja Nord Pallaresa).



Canal del Cristall (Vessant Nord del Cadí), des del Prat de Cadí, amb un mantell en retrocés i discontinu, el 10 de maig.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil i sondeig realitzats a Boí-Taüll-Cerbi (Ribagorçana), a un vessant nord-est, a 2.275 m, el 6 de maig. En superfície, apareixen 5 cm de neu fragmentada pel vent. Per sota, el mantell apareix humit en la seva totalitat, alternant-se les formes humides amb una crosta degradada.