

Resumen nivològic semanal


Síntesis de la semana del 19 al 25 de mayo de 2025.

La semana se ha caracterizado por el ciclo de fusión-rehielo y por los chubascos de tarde que han estado presentes a lo largo de la semana, con una cota de nieve entre los 2300 y los 2700 m, bajando puntualmente en momentos de lluvia fuerte hasta los 2000-2100 m. Durante el fin de semana, los chubascos han sido en forma de tormenta en el Pirineo oriental, y han dejado 18 mm en Núria, 14 mm en Ulldeter y 6 mm en Prat d'Aguiló (Cadí). Las precipitaciones han sido menos intensas en el Pirineo occidental, con 6 mm en Espot y tan solo 1 mm en Bonaigua, en ambos casos con agua hasta las cimas o las crestas más elevadas.


Las temperaturas han subido de forma notable durante la semana, especialmente el sábado y domingo. Los chubascos dispersos y las altas temperaturas han hecho disminuir el manto nivoso un total de 20 cm entre el lunes y el domingo en Boí (2500 m).

Todos los sectores están actualmente con nota nivológica y seguirán en nota a no ser que las condiciones cambien de forma drástica.

En cuanto a la distribución del manto, en el Pirineo occidental está presente a partir de los 2200-2300 m en umbrías, de forma discontinua hasta unos 2500 m. En el resto de orientaciones, aparece a partir de los 2400 m, con discontinuidades hasta las cimas. A unos 2500 m, en umbrías, los espesores rondan los 40 cm, excepto en la Ribagorçana-Vall Fosca, donde se acercan a los 90 cm y son superiores a los habituales para estas fechas. En Perafita-Puigpedrós o en Ter-Freser el manto está presente, de forma discontinua, a partir de los 2500 m en umbrías. En el resto de orientaciones, aparece a partir de los 2500 m, con discontinuidades hasta las cimas. En la Vessant Nord del Cadí-Moixeró solo encontramos algo de continuidad en la parte superior de las canales.



Evolució del espesor de nieve en el suelo en la estación de Boí (Ribagorçana), a 2.535 m. Se observa un descenso del espesor debido a los chubascos con agua a cotas altas y a las altas temperaturas, especialmente el domingo, cuando la temperatura alcanzó los 10 °C. El espesor total es de 86 cm el domingo por la tarde.



Evolució de la temperatura del aire màxima y mínima en la estación de Boí (Ribagorçana), a 2.535 m. Se observa un primer pico el miércoles. La temperatura baja el jueves y después vuelve a subir de forma continuada viernes, sábado y domingo. La noche del sábado al domingo ya no hay rehielo, y el domingo se alcanza el máximo de 10 °C.



Imagen desde el Port de Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa) con vistas hacia el sector de Montroig y Montarenyu, miércoles 21 de mayo. Se observa nieve en cotas altas y de forma discontinua. En las solanas casi no queda nieve. Imatge: Cos d'Agents Rurals



En las umbrías del Port de Tavascan, a 2.470 m, se encuentra un manto bastante continuo con nieve húmeda y compactada, pero con costras duras en la superficie. La situación es propia de final de temporada. Imatge: Cos d'Agents Rurals



Manto discontinuo en el refugio de Certascan a 2.240 m (Franja Nord de la Pallaresa). Aparecen en la superficie las costras de polvo sahariano. Imagen del domingo 25 de mayo.
Imatge: projecte4estacions



Desde el refugio de Amitges (2.365 m) se encuentra un manto discontinuo hasta los 2.500 metros en el sector norte de la Pallaresa. En las umbrías se observa mayor continuidad, especialmente a partir de los 2.600 m.
Imatge: projecte4estacions