

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 9 al 15 de febrer de 2026

Comencem la setmana amb ambient suau i humitat elevada. El darrer front ha acumulat de 2 a 5 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb poc transport pel vent de l'Oest. Aquesta nevada cau damunt de crosta, més dura a solanes, i a les obagues la neu es mostra poc compactada i no gaire incohesiva. Pel que fa a activitat d'allaus, es desencadenen artificialment algunes de neu recent i plaques toves, en obagues, de mida petita i mitjana, en l'entorn de l'estació de Baqueira-Beret. També s'observa activitat accidental de neu recent humida, sense més conseqüències, en terreny dret. Els tests d'estabilitat mostren un trencament i propagació amb un esforç gran (ECTP25), en el contacte amb gobelets, en zona de mantell prim, a obaga, a 2.400 m, a l'Aran.

Dimarts, un front càlid fa pujar la cota de neu fins els 2.400 m, provocant una estructura de placa per nevada inversa, amb una pèrdua de cohesió força sensible, a causa de la humitat. En 48h s'acumulen fins a 40 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

Degut a la pluja a cotes properes als 2.500 m, amb l'humitejament del mantell, augmenta el grau de perill per problemes amb la neu humida i els lliscaments, amb un grau Marcat (3) a tot el Pirineu, passant a Fort (4) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

L'activitat és nombrosa entre dimarts i dimecres, amb la caiguda natural d'allaus de neu humida, de mides petita, mitjana i gran. També cauen lliscaments basals i desencadenen amb explosius plaques que generen allaus de mida gran, en vessant sud, en l'entorn de Baqueira-Beret. Cauen allaus naturals de neu recent humida a totes les orientacions, a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A Tavascan (Franja Nord Pallaresa) cauen, naturals, allaus humides que afecten infraestructures en pistes d'esquí i s'observa una placa humida de mida gran entre el Tuc de la Cima i Campirme. Al Vessant Nord del Cadí cauen, naturals, dues allaus de mida gran (Canal de l'Ordiguer i el Vulturó).

De cara al cap de setmana l'activitat allavosa augmenta per la nevada abundant amb vent fort del Nord-oest, de dissabte. El perill anirà va progressiu augment i els problemes predominants són les plaques de vent i les allaus de neu recent. Divendres, de fet es formen plaques també, generades pel vent de Sud, damunt d'un nivell de cristalls facetats, a sobre de les crostes superficials. Damunt d'aquestes plaques se'n formen de noves, amb la nevada i el vent de dissabte. Aquestes noves plaques són molt fràgils i cauen de manera natural o al pas d'un esquiador, generant allaus de mida gran. Dissabte es desencadena una allau a l'Aran (Tuc de Sacaubà- Uishèra), amb un grup de 5 esquiadors, amb dues persones enterrades, que són rescatades pel propi grup. Diumenge, una nova allau accidental, arrossega i provoca ferides a un esquiador, a la Pallaresa (la mida és petita, però el vessant és molt dret i provoca una caiguda forta a l'implicat).

El grau de perill és Fort (4) per plaques de vent i neu recent a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre dissabte i dilluns, passant a un patró de neu ventada i neu humida a inici de setmana. A la resta del Pirineu el grau es manté Marcat (3), excepte al Prepirineu, on serà Moderat (2), per sota del límit del bosc.


Pel que fa a la distribució del mantell nival, trobem al terra a 1.000 m. El mantell és esquiable per damunt d'uns 1.500 m. Els gruixos a uns 2.200 m volten els 100-140 cm al nord de l'Aran i 130-180 cm a la Franja Nord Pallaresa i al sud de l'Aran. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca hi ha neu al terra a 1.500 m. Els gruixos assoleixen els 120-150 cm. Al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt de 1.500-1.600 m. Els gruixos volten els 100-140 cm a uns 2.000 m. A la resta de sectors els gruixos es mouen entre els 90 i els 140 cm, excepte al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, on arriben a fregar els 170 cm.



Imatge de paisatge de la Vall de Filià, amb els Pics de Fitero i Filià (Vall Fosca), de dilluns 9 de febrer. S'aprecia el mantell continu a totes les orientacions, fins i tot a terreny assolellat i als indrets més afectats pel vent.



Aspecte del mantell el dia 9 de febrer a Arànsers (Perafita-Puigpedrós). El gruix del mantell nival volta els 2 m a 2.200 m, molt ben distribuïts pel terreny. S'aprecia la formació incipient de gel de superfície.



Allau de neu humida a Canal de l'Ordiguer (Vessant Nord del Cadí-Moixeró) dimecres 11 de febrer. Les pluges del dia anterior van humitejar el mantell i van donar lloc a un cicle d'elevada activitat d'allaus de mida petita i mitjana.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic realitzat l'11 de febrer a Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa). Després de l'episodi de pluges fins a uns 2.500 m, el mantell presenta una dura i gruixuda crosta superficial damunt d'uns 20 cm de formes humides. Es tracta d'un mantell predominantment estable. Els posteriors episodis de vent no generaran un transport efectiu ja que la neu més incohesiva queda protegida per la crosta.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic realitzat el 13 de febrer a Clots de la Bassa (Pallaresa). El mantell nival està format principalment per crostes i gra fi, formes típicament estables. La crosta més propera a la superfície, de prop de 10 cm, és portant i aïlla en bona part els esforços cap a la resta del mantell.