

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 2 al 8 de març de 2026

Les últimes nevades destacables a Pirineu queden ja molt enrere, especialment al vessant sud de la serralada. A inici de la setmana l'estabilitat del mantell estava marcada per la fusió i el regel superficials, amb molt poca activitat allavosa associada al problema de neu humida, i per l'ocurrència de lliscaments basals. A bona part del terreny la base del mantell es trobava humida i, sovint, a obagues amb cristalls facetats antics. Les elevades temperatures sostingudes afavorien l'ocurrència de lliscaments basals, que van afectar principalment l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa entre dilluns i dimecres. El grau de perill es situava entre Feble (1) i Moderat (2) a tots els sectors.

Dijous va començar un primer episodi de precipitació, en forma de pluja fins uns 2.400-2.500 m a l'inici i que va afectar especialment els sectors més orientals del Pirineu, on es van acumular 30-50 mm. El mantell es va estovar superficialment a tots els sectors i es van registrar allaus naturals de neu humida de mides 1 i 2 al Ter-Freser.

La cota de neu va baixar entre dijous i divendres fins uns 1.600 m i van continuar les precipitacions, novament les més abundants als sectors més orientals, i amb vent poc destacable. El grau de perill va pujar a marcat (3) a tots els sectors, pels problemes de neu recent a cotes altes i de neu humida a cotes baixes. L'activitat d'allaus va ser intensa a partir de divendres al Ter-Freser i a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en forma d'allaus de neu humida i lliscaments basals a cotes baixes, i d'allaus de placa de neu recent a partir de 2.200 m; cal destacar les plaques toves desencadenades dissabte a les Canals del Gra de Fajol (Ter-Freser), de mida 2 però molt nombroses. De manera local es van registrar purgues humides a Pallaresa.

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa trobem neu per damunt d'uns 1.400-1.500 m a obagues i 1.700 m a solanes. Els gruixos a uns 2.200 m són superiors als normals a la Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat sud de l'Aran on volten els 180-220 cm. A la meitat nord de l'Aran hi ha uns 120-140 cm de gruix total. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa trobem neu a terra a 1.600 m, a terreny obac, i per damunt d'uns 1.800 m, a vessants assolellats. El mantell és esquiable per damunt d'uns 1.700-1.800 m a obagues. Els gruixos assoleixen els 100-130 cm i a la Ribagorçana-Vall Fosca freguen els 160 cm a uns 2.200 m. Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, hi ha neu per damunt de 1.600 m, esquiable per damunt d'uns 1.700 m. A solanes la neu és present per damunt de 1.800 m. Els gruixos estan al voltant de 160-180 cm a 2.200 m. Aquests valors són molt excedentaris per l'època de l'any. Al Ter-Freser el mantell presenta gruixos molt excedentaris per l'època de l'any. En llocs no afectats pel vent els gruixos oscil·la entre 80-100 cm a uns 2.000 m i més de 200 cm per sobre de 2.400 m. Al Perafita-Puigpedrós es trobem entre els 80 i els 100 cm i al Prepirineu entre els 60 i els 80 cm.



Lliscament basal a un vessant est, al cim del Balandrau, el 3 de març. Els plugims de dies enrere van humitejar el mantell fins a la seva base. Imatge: Cos d'Agents Rurals.



Purga de neu recent a les Picardes, a Espot (Pallaresa), el 6 de març.



Allaus de neu recent humida, de mida mitjana, al vessant nord del Gra de Fajol Petit (Ter), el 7 de març. Imatge: Mossos d'Esquadra (UIM).


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic i sondeig penetromètric realitzat el 5 de març a Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa). La duresa del mantell és alta a bona part del gruix, on predomina el gra fi. En canvi, a la base i a la superfície la neu es presenta més tova. Aquells dies el perill es trobava en les possibles purgues superficials per humitejament i en l'activitat de lliscaments basals.