



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 9 al 15 de març de 2026

La darrera nevada del cap de setmana precedent ha acumulat de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1.600 m a l'Aran-Franja Nord Pallaresa. A la resta del Pirineu els gruixos han estat més minsos. El patró predominant és el de la neu seca a les obagues i a les cotes més altes de les solanes i, per altra banda, trobem neu humida per sota dels 2.400 m a les solanes.

Es mantenen les plaques de vent a l'Aran-Franja Nord Pallaresa sota colls i carenes per sobre de 2.300-2.400 m que es van s'han formar a finals de la setmana passada. Es troben en orientacions NW, N i NE, i puntualment en W. Els tests d'estabilitat, a cotes altes obagues, mostren propagació de fractures dins de capes febles. A cotes altes, les plaques de vent tapades de la neu més recent descansen a sobre d'una crosta de pols sahariana. La part inferior del mantell és més pobre pel que fa a la seva estabilitat, a causa de la presència de neu ventada i de facetes. En particular a cotes baixes i també als vessants inclinats assolellats el mantell de neu és humit de manera generalitzada, amb un cicle de fusió-regel ben marcat i la presència de crostes superficials no portants.

Pel que fa a activitat d'allaus, amb la nevada acompanyada de vent s'han format plaques de vent que són susceptibles d'accidentabilitat. De fet, a inici de la setmana diversos esquiadors trenquen plaques de vent i desencadenen allaus, en general, de mida petita, a orientacions oest i nord-est, a l'Aran, sense conseqüències. Aquestes plaques (petites), en alguns casos, es trenquen a distància per la presència de gel de superfície i de facetes. Cauen també purgues de neu recent seca a obagues elevades i purgues de neu humida a solanes. L'humitejament intern del mantell, sobretot a solanes, ha fet que s'hagi observat activitat de lliscaments basals de mida mitjana (per exemple, a orientació Oest, a l'Aran).

Durant el cap de setmana un front força actiu acompanyat de fort vent del NW ha acumulat entre 25 i 30 cm a l'Aran-Franja Nord Pallaresa i entre 5 i 15 cm a la resta del Pirineu. La neu nova és freda i compactada pel fort vent, amb zones deflactades a carenes i prop de cims. Les plaques es van engruixint i apareixen en orientacions Est i Sud. Amb la insolació, la neu es mostra més pesada a solanes altes i comença un inici d'humitejament. Les plaques de vent descansen a sobre de capes febles, especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m, aproximadament. Els vessants perillosos són aquells on el gel de superfície ha quedat cobert de neu.

L'activitat allavosa es reactiva i cauen diverses plaques de vent naturals, de mida mitjana, a orientació N, NE i E (a l'Aran i al límit amb la Franja Nord Pallaresa). Cauen també plaques al pas d'esquiadors, en orientació S i SE, de mida petita i mitjana, a l'entorn de l'estació de Baqueira-Beret. S'observa també una placa de vent natural de mida petita a Setfonts (Moixeró), de diumenge.

El grau de perill es manté Moderat (2) durant gran part de la setmana i només s'incrementa a partir de divendres, que passa a Marcat (3) per problemes relacionats amb les plaques de vent i les capes febles persistents.


Trobem neu a l'Aran-Franja Nord Pallaresa per damunt d'uns 1.400 a obagues i 1.700 m a solanes. Els gruixos a uns 2.200 m són superiors als normals a la Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat sud de l'Aran on volten els 180-220 cm. A la meitat nord de l'Aran hi ha uns 120-140 cm de gruix total. A la resta de sectors del Pirineu Occidental hi ha neu al terra a 1.600 m en N, i a 1.800-1.900 m en S. El mantell és esquiable per damunt d'uns 1.800-1.900 m a obagues. Els gruixos assoleixen els 110-160 cm, en general, a 2.300 m. Al Pirineu oriental hi ha neu al terra per sobre de 1.600-1.700 m. És esquiable a partir d'uns 1.700 m i presenta gruixos molt excedentaris per l'època de l'any que oscil·len entre 85-105 cm a uns 2.000 m i més de 150 cm per sobre de 2.400 m, per exemple, al Ter-Freser. Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos estan al voltant de 160-180 cm, a 2.200 m i al Prepirineu es mouen entre els 65 i els 85 cm, a 2.200 m.



Allau natural de neu recent, de mida 2 (mitjana), als contraforts del cim del Bastiments (Ter), el 9 de març.



Mantell continu i amb una mica de regel superficial, des de Boí (Ribagorçana), el 10 de març.



La darrera nevada ha estat feble, amb una fina capa de neu recent als arbres i damunt del mantell, el 10 de març, a Coma Oriola (Moixeró).



Mantell regular i abundant, des de la Vall Fosca, el 10 de març.



Allau de neu humida (possible lliscament basal), vist des del Pla de Mulleres, desencadenat de manera natural a una de les canals del Tuc del Porth de Vielha (Aran), a un vessant oest, del dia 11 de març. Imatge: Luis de Santiago.



Allau de neu humida, natural, de mida 2 (mitjana), a la Canal Baridana (Vessant Nord del Cadí), observada el 13 de març.

