

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 6 al 12 d'abril de 2026

La setmana comença amb temperatures ambientals positives, humitats mitjanes i cel radiant, un fet, aquest darrer, que ajuda que el regel sigui més o menys efectiu, amb crostes dures a primera hora del dia. En general, durant gran part de la setmana es repeteix el procés de fusió-regel, amb crostes portants al matí i un estovament progressiu del mantell més superficial amb el pas de les hores, amb presència de solcs a causa de l'efecte de la radiació o la humitat. A les obagues elevades, per damunt de 2.500 m, el mantell es mostra encrostat i la transformació amb l'avanç de la jornada és més lenta. No obstant això, en alguns indrets encara trobem una mica de pols reciclada, sobretot en obagues protegides elevades.

Les capes febles persistents properes a la superfície, a obagues de l'Aran, per exemple, encara són identificables i les trobem localitzades sota de plaques cada vegada més dures i una mica reactives, quan aïllem una columna. De fet, en alguns dels test d'estabilitat realitzats s'observen trencaments i alguna propagació (ECTP16 i ECTP20), en el contacte amb el gebre enterrat i amb les facetes adjacents a les crostes. Pel que fa a indicis de placa, en circular pel terreny no s'aprecien fissures o *woumfs*.

Durant els primeres dies de la setmana es reporten alguns lliscaments basals de mida 2 (mitjana), purgues humides i algunes plaques naturals, de mida mitjana, en cotes altes i mitjanes de l'Aran, a orientacions Est, Nord i Oest.

El mantell es manté primaverall i estable fins el cap de setmana, quan s'observen alguns canvis amb l'arribada d'un front fred. Diumenge la temperatura cau bruscament i les humitats es mantenen elevades, amb boires i núvols baixos. S'observa deposició de pols sahariana i cauen entre 5 i 7 cm de neu recent i neu ventada a partir dels 1.800-2.000 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. Al Pirineu oriental i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró s'acumulen de 2 a 5 cm (3 cm a Núria i 4 cm al Pastuiria, a 2.000 m, a Vallter). En general, el mantell segueix mantenint-se molt humit, especialment a obagues, on la humitat ha anat penetrant i s'ha apropiat als nivells basals.


Pel que fa activitat d'allaus, s'observen nous lliscaments basals i allaus humides de mida 1 (petites) i 2 (mitjanes) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

El grau de perill a inici de setmana es va mantenir Marcat (3) per damunt dels 2.200 m a l'Aran-Franja Nord Pallaresa i Moderat (2) a la resta de sectors del Pirineu, excepte al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, on continuava sent Feble (1), pujant a Moderat (2) durant les hores de més insolació. Durant la resta de setmana es va mantenir entre Feble (1) i Moderat (2), per tornar a pujar fins a Marcat (3) durant el cap de setmana, excepte al Prepirineu, on es va mantenir Moderat (2). Els problemes van estar relacionats amb la neu ventada i la neu humida.

Els gruixos es mantenen molt excedentaris a Pirineu Oriental, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i són propers a la normalitat a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. La neu ha anat reculant de les solanes més baixes a fora del Vessant nord del Pirineu, i ja és present a partir d'uns 1.900-2.000 m. A obagues hi ha neu per sobre d'uns 1.600-1.700 m a tots els sectors, tot i que les nevades de mitja setmana i les de diumenge van emblanquinar el terra fins a fons de vall. Per exemple, fins




dissabte al matí (abans de la nevada de diumenge) a l'Aran-Franja Nord Pallaresa hi havia neu a terra per sobre de 1.800-1.900 m en obagues i de 2.000 m en solanes. Els gruixos a uns 2.200 m volten els 140-210 cm. A la Pallaresa els gruixos assoleixen els 80-100 cm a uns 2.200 m, amb freqüents deflacions i acumulacions per damunt del nivell del bosc. Al Ter-Freser els gruixos són molt excedentaris per l'època de l'any i en llocs no afectats pel vent oscil·len entre 50-80 cm a uns 2.000 m, i més de 130-200 cm per sobre de 2.400 m, molt variable pels efectes del vent.



Gruix total de neu a terra a l'estació de Malniu (Perafita-Puigpedrós), a 2.300 m. Les altes temperatures i la radiació solar fan que la neu fongui completament, fins dissabte. Diumenge s'aprecia una lleu pujada (2 cm), a causa de la nevada feble.




Mantell vell, primaveral, sotmès al procés de fusió-regel a Boí-Taüll (Ribagorçana), el 6 d'abril. La neu apareix endurida a primera hora i amb el pas de les hores es transforma i s'estova. En superfície apareix la pols sahariana.



Dues allaus de placa al vessant nord-est del Tuc de Muntanyó (Franja Nord de la Pallaresa). Per damunt de la cicatriu de l'allau de l'esquerra s'intueixen dues traces d'esquiadors. L'allau es va desencadenar, probablement, després de la nevada del cap de setmana anterior. Les allaus es van observar dimarts, dia 7.



Paisatge d'alta muntanya a Ulldeter (Ter), el 8 d'abril, amb un mantell continu i primaveral, endurit a primera hora i estovat a mig matí i migdia.



Purga de neu humida observada al Vessant Nord del Cadí, el dia 10 d'abril.



Allau de placa humida, natural, observat a la Peulha (Franja Nord de la Pallaresa), dissabte, dia 11 d'abril.

