

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 13 al 19 d'abril de 2026


La setmana precedent va finalitzar amb un episodi de nevades generalitzades i uns 10-20 cm de neu, sovint transportada pel vent de component nord. Les temperatures a l'inici de la setmana havien estat baixes, amb mínimes de fins a -6,7 °C a Salòria dilluns 13, fet que contribuïa a l'encrostament de la neu antiga. Les nevades van continuar, de manera minsa, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre dilluns i dimarts. El principal element a tenir en compte pel que fa al perill d'allaus era la presència de plaques de vent a alguns sotavents, sensibles a caure al pas de persones. De fet, a Tuixent (Prepirineu) dilluns se'n van desencadenar de manera natural dues allaus de mida 1. Dimarts a Beret dos esquiadors van provocar una allau de placa de vent al seu pas, sense conseqüències. També va haver-hi algunes allaus humides a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, que afectaven la neu de l'últim episodi. El perill era MODERAT (2) a tots els sectors per damunt del nivell del bosc.

Amb el pas dels dies, la pujada de la temperatura i la insolació típicament primaveral, les plaques de vent van quedar ràpidament restringides als sectors més obacs i elevats, al temps que anava guanyant protagonisme l'humitejament de la neu durant les hores diürnes. El refredament i regel matinal entre dilluns i dimecres va ser molt intens, amb temperatures superficials de la neu sovint per sota de -10 °C; de fet, dimecres no es va registrar activitat d'allaus.

A partir de dijous, l'humitejament de la neu va avançar, amb presència d'aigua líquida a nivells progressivament més profunds del mantell i que en molts casos afectava la totalitat de la neu. Pel que fa a l'activitat d'allaus aquest procés va donar lloc a allaus de neu humida, tant superficials com de fons, que afectaven l'Aran, la Franja Nord Pallaresa, la Ribagorçana-Vall Fosca i el Ter-Freser. El perill es concentrava en els moments de màxima insolació entre dijous i divendres, quan era MODERAT (2) a tots els sectors.

L'humitejament va avançar encara més durant els plugims de dissabte i els ruixats generals, sovint amb cota de neu per damunt dels cims més elevats, de diumenge. El perill va pujar a MARCAT (3) en aquests moments, a tots els sectors tret de Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró.

El mantell ha continuat reculant a tots els sectors, i ja és discontinu a terreny assolellat per sota de 2.000 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i dels 2.400 m al Perafita-Puigpedrós. A obagues el mantell és continu per damunt de 1.800-2.000 m.



Evolució de la temperatura a Port del Comte (Prepirineu) entre els dies 13 i 19 d'abril. Entre dilluns i dimecres la temperatura augmenta de manera considerable. A partir d'aleshores tenim mínimes clarament positives i màximes per damunt de 8 °C a 2.300 m.



Imatge del vessant sud de Cadí i, en primer pla, el vessant nord de la Tossa Pelada, dilluns 13 d'abril. La disponibilitat de neu a Prepirineu va minvant, en especial de terreny assolat. A la superfície del mantell reposa algun centímetre de neu de dies enrere, sovint transportada pel vent.



Imatge d'una allau de neu humida a Beret (Aran-Franja Nord de la Pallaresa), dimarts 14 d'abril. Va caure de manera natural i va assolir mida 3.



Paisatge de la Vall de Filià (Ribagorçana-Vall Fosca) dijous dia 16 d'abril. A 1.900 m la cobertura nival és encara continua a terreny obac però ja és inexistent a solanes i sectors drets rocosos. La present temporada ha estat destacable per l'elevat nombre de dies en què el mantell ha estat esquiable a vessants sud a aquest sector.



Lliscament basal caigut a Coma Ombriga (Ter-Freser) dijous 16 d'abril. Tot i alguns precedents de lliscaments basals a aquest sector, la mida i la freqüència de les mateixes aquesta temporada ha estat molt per damunt de l'habitual.

