

Resum nivològic setmanal


Síntesi de la setmana del 20 al 26 d'abril de 2026

La setmana ha estat marcada per un cicle de matins estables i xàfecs de tarda que han contribuït a la fusió del mantell. De fet, el gruix del mantell s'ha mostrat humit en la seva totalitat a causa de les tronades, les humitats elevades, les temperatures positives i la intensa radiació. Durant la matinada ha regelat lleument a obagues però la neu s'ha transformat ràpidament amb el transcurs del matí. La temperatura interna de la neu ha estat isoterma, prop dels 0 °C i les crostes internes es mostraven degradades, amb l'aflorament en superfície de la neu marró sahariana enterrada.

Amb el pas dels dies l'humitejament de la neu ha avançat, amb presència d'aigua líquida a nivells progressivament més profunds del mantell i que en molts casos han afectat la totalitat de la neu. Pel que fa a l'activitat d'allaus ha estat reduïda, amb alguns lliscaments observats a l'Aran (de mida mitjana i gran). També s'ha observat alguna purga accidental, al pas d'esquiadors, de neu humida, sense conseqüències.

El perill es concentrava en els moments de màxima insolació i de xàfecs, i ha estat MARCAT (3) a partir de 2.000 m a l'Aran-Franja Nord Pallaresa i MODERAT (2) per sota. A la resta de sectors ha estat MODERAT (2) a partir de mig matí i amb xàfecs, i FEBLE (1) a primera hora.

El mantell ha continuat reculant a tots els sectors. A l'Aran-Franja Nord Pallaresa hi ha neu a terra amb continuïtat i esquiabile per sobre dels 2.000 m en obagues i és més discontinua a solanes, a partir de 2.200 m. Els gruixos a uns 2.300 m volten els 100-140 cm, amb sobreacumulacions que encara s'apropen als 200 cm. Els valors s'apropen als normals per a l'època. A la resta del Pirineu occidental s'assoleixen els 70-90 cm a uns 2.200 m, amb freqüents deflacions i acumulacions per damunt del nivell del bosc. Al Vessant Nord del Cadí hi ha neu per sobre de 2.000 m en N i de 2.100-2.200 m en Sud, de manera molt escassa i discontinua. S'assoleixen els 100-120 cm a uns 2.200 m, a obagues. Al Ter-Freser els gruixos volten els 40-70 cm a uns 2.200 m, i més de 130-190 cm per sobre de 2.400 m.



Gruix de neu a terra a l'estació de Sasseuva, a 2.228 m (Aran). El mantell ha anat retrocedint a causa dels xàfecs diaris i de la intensa radiació.



Paisatge innivat des d'Arànsers (Perafita-Puigpedrós) direcció al coll de la Barra, el dia 20 d'abril. El mantell ha reculat i la neu primavera, humida, apareix de manera discontinua als vessants assollellats.



Imatge del vessant nord del Cadí i, en primer pla, la Roca de l'Ordiguer i la Canal del Cristall, el 21 d'abril. La disponibilitat de neu va minvant, i només trobem continuïtat dins de les canals, a les obagues.



Lliscament basal al massís de Certascan (Franja Nord Pallaresa), observat des de Tavascan, el dia 25 d'abril.



Dipòsit d'un lliscament basal observat a Tavascan (Franja Nord Pallaresa), el 25 d'abril.

