



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 27 d'abril al 3 de maig de 2026

Les condicions han estat les habituals per una primavera avançada. La disponibilitat de la neu continua reculant amb el pas de les jornades, les temperatures elevades, absència de nevades i els ruixats de tarda. A terreny assolellat només hi ha certa continuïtat al nord del Pirineu Occidental a partir d'uns 2.300 m. A la resta del Pirineu Occidental i al Pirineu Oriental el mantell es presenta en forma de congestes a terreny assolellat. En canvi, en terreny obac hi ha neu a partir d'uns 1.900 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, uns 2.000-2.100 m al nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, i dels 2.100 m, amb certa discontinuïtat, a la resta. Els gruixos de neu, que han estat excedentaris bona part de la temporada, ara ja es troben en valors normals o deficitaris a tota la serralada, i superen el metre només a les obagues més elevades i a zones d'influència atlàntica.


Pel que fa al mantell nival, es troba format de forma pràcticament exclusiva per gra de fusió i per algunes crostes. Durant bona part de la temporada, el mantell nival ha presentat destacables gruixos de gra fi, endurit i estable. En arribar l'humitejament de la neu, s'ha transformat en gra de fusió, però es tracta en molts casos encara de neu dura i de grans petits. En aquestes condicions, les allaus de fusió són de poca envergadura.

Els principals problemes han estat els lliscaments basals i la neu humida. S'ha registrat dos lliscaments basals, un a la Franja Nord de la Pallaresa i un altre a Ter-Freser, naturals i de mida suficient per enterrar una persona.

El grau de perill s'ha mogut entre Feble (1) i Moderat (2), per bé que entre dilluns i dimarts era Marcat (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a la tarda.



Evolució de la temperatura a Certascan (2.400 m, Franja Nord de la Pallaresa). Durant tota la setmana no va arribar a gelar a 2.400 m.



Evolució del gruix de neu a Bonaigua (2266 m, Franja Nord de la Pallaresa), entre el 27 d'abril i el 3 de maig de 2026. El mantell minva uns 40 cm al llarg de la setmana, a un ritme bastant homogeni.



Vessant sud del Cadí des de Tuixent el 28 d'abril. La disponibilitat de neu queda restringida a congestes fora de les obagues, on la neu també recula ràpidament.



Distribució del mantell al sector de Certascan (Franja Nord de la Pallaresa). Es pot apreciar un lliscament basal a un vessant sud-oest. A les cotes més baixes s'aprecien dipòsits antics d'allaus que van caure al sector de Noarre.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic i sondeig penetromètric realitzat a Tesso de Son (Pallaresa), el 29 d'abril. El mantell es troba a 0 °C en la seva totalitat, i està compost per gra de fusió i algunes crostes. Les dureses del centre del mantell, anteriorment format per gra fi, són elevades, fet que confereix certa estabilitat a la neu. A la base i en superfície trobem la neu més tova, associada respectivament als lliscaments basals i al problema de neu humida.