

Resum nivològic setmanal


Síntesi de la setmana del 18 al 24 de maig de 2026

El mantell ha anat reculant a causa de les altes temperatures, l'elevada radiació i els xàfecs de tarda. Una massa d'aire càlid impulsada per un potent anticicló ha fet pujar el termòmetres, a partir de mitja setmana, fins els 18 °C a 2.200 m, amb mínimes d'entre 6 °C i 8 °C.

Al Pirineu occidental encara s'ha observat una lleu enfarinada a inici de setmana i s'ha vist neu al terra en forma de congestes aïllades entre 2.100 m-2.400 m, amb continuïtat per sobre de 2.400 m, excepte en orientació sud. A 2.200-2.400 m els gruixos es troben entre 20-40 cm i estan ja una mica per sota dels normals per l'època. La fusió ha anat avançant a raó de 8-10 cm per dia i s'ha accelerat amb l'episodi càlid. Al Vessant Nord del Cadí hi ha neu al terra a les canals en forma de congestes per sobre de 2.200 m. Hi ha alguna congesta aïllada al Moixeró per sobre de 2.400 m, per exemple, a la Tossa d'Alp.

El poc mantell que queda està molt humit internament i es presenta més endurit a primera hora del matí, però ràpidament s'estova i perd cohesió durant el dia.

El darrer butlletí de perill de la temporada s'ha emès el dia 22 de maig.



Evolució del gruix de neu a terra al llarg de la setmana a la Bonàigua (Franja Nord Pallaresa), a 2.266 m. El descens és gradual, a causa de les altes temperatures i la radiació, fins arribar a la fosa total, diumenge, dia 24.



Enfarinada des de Boí-Taüll (Ribagorçana), amb la Pica Cerví de Durro, al fons, el 18 de maig.

Font: <http://www.roundshot.com/>



Aspecte del mantell a Vallter, el 23 de maig. Apareixen congestes i una mica de continuïtat al coll de la Marrana.

Font: <http://www.roundshot.com/>



Mantell discontinu i congestes al Vessant Nord del Cadí, el dia 21 de maig. A la part esquerra de la imatge es pot apreciar un dipòsit d'una allau antiga, amb una llengua que arriba fins el fons d'un barranc, entre mig del bosc.