



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 16 al 22 de desembre de 2013

Es manté la situació anticiclònica que ha predominat durant la primera quinzena de desembre, però les temperatures han anat davallant gradualment. A l'Aran ja no cauen més allaus de lliscament. La neu es manté encrostada en orientacions assolellades, mentre que les obagues es mantenen amb neu solta i freda, pols reciclada o "*sugar snow*", capes formades per cristalls facetats que es formen a prop de la superfície degut al fort gradient tèrmic que té lloc a la part superficial del mantell (veieu gràfic al peu).

El dia 19 hi ha un breu parèntesi amb nevades a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 15-20 cm de neu recent, amb temperatures baixes i transport de neu amb vent de component nord; la cota de neu baixa de 2200 m a 1000 m el dijous 20 al matí. Al vessant sud del Pirineu occidental la cota pluja-neu va començar a 2500 m, baixant a 1600 m al final, amb només 2-6 cm de neu recent, entre 5-10 cm al Pirineu oriental. Formació de petites plaques de vent en orientacions est i sud, localment a les obagues on cauen algunes petites allaus de placa al pas d'alguns esquiadors a l'Aran.

Acaba la setmana amb un temps novament anticiclònic; feble encrostament de les solanes i les obagues es mantenen amb neu pols.



Aspecte de la vall de Filià (Vall Fosca) el divendres 20 de desembre, amb una innivació molt per sota de l'habitual per l'època.




Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil del mantell fet a la vall de Subenuix (Pallaresa) el 19 de desembre, en un vessant obac. El mantell està format per cristalls solts que dóna la sensació d'esquiar en neu pols, però que en realitat és neu molt vella.